

<p style="text-align: justify;">Il disturbo da uso di alcol

(AUD) ◆uno dei disturbi psichiatrici pi◆ diffusi e comporta conseguenze serie e dannose.</p>

<p style="text-align: justify;">Gli approcci terapeutici, compresa la farmacoterapia, svolgono un ruolo importante nel trattamento delle persone affette da AUD; nel 2022 ◆stato effettuato un aggiornamento di una revisione Cochrane pubblicata per la prima volta nel 2018, al fine di valutare i benefici e i danni del Baclofen sul raggiungimento e sul mantenimento dell'astinenza o sulla riduzione del consumo di alcol nelle persone con AUD rispetto al placebo, a nessun trattamento o a qualsiasi altro trattamento farmacologico di prevenzione delle ricadute.</p>

<p style="text-align: justify;">Gli esiti primari considerati sono: ricaduta, frequenza d'uso, quantit◆d'uso, eventi avversi, abbandono del trattamento e abbandono del trattamento a causa di eventi avversi. Gli esiti secondari considerati sono: craving, ansia, depressione e frequenza degli eventi avversi pi◆ rilevanti.</p>

<p style="text-align: justify;">Rispetto al placebo, il Baclofen probabilmente riduce il rischio di ricaduta nel bere e aumenta la percentuale di giorni di astinenza. Questi risultati possono essere pi◆ evidenti nelle persone che iniziano il trattamento dopo disintossicazione, rispetto alle persone non disintossicate. Non vi ◆un aumento del numero di partecipanti che presenta almeno un evento avverso, n◆di quelli che abbandonano il programma per qualsiasi motivo o a causa di eventi avversi. Probabilmente non riduce il numero di giorni di consumo ◆pesante◆ e il numero di bicchieri al giorno di consumo, cos◆come probabilmente non ha effetto sul ◆craving, ansia e depressione. Le prove attuali suggeriscono che il Baclofen pu◆aiutare le persone con AUD a mantenere l'astinenza.</p> <p style="text-align: justify;">Clicca qui per il link della pubblicazione</p>