

<p style="text-align: justify;">Le

evidenze dimostrano che il caldo estremo ha effetti sia sulle donne in gravidanza che sui loro neonati, ma pochi studi erano disponibili relativamente all'Africa subsahariana.</p> <p

style="text-align: justify;">Utilizzando i dati di 138.015 nascite in 16 ospedali in Benin, Malawi, Tanzania e Uganda, il DEP ha collaborato a uno studio recentemente pubblicato sulla

prestigiosa rivista Nature Medicine, che ha esaminato l'associazione tra caldo estremo e decessi perinatali precoci, inclusi nati morti antepartum e intrapartum, e decessi entro 24 ore

dalla nascita.</p> <p style="text-align: justify;">I risultati indicano un legame tra l'aumento delle temperature e un incremento della mortalit  perinatale, in particolare per i nati morti intrapartum.

L'associazione si   rivelata pi  forte durante le stagioni pi  calde, evidenziando come l'esposizione a breve termine alle temperature calde pi  estreme possa aumentare i rischi di

mortalit  neonatale, e suggerendo la necessit  di migliorare le cure durante la gravidanza, in particolare nelle sue ultime fasi, e durante il parto.</p> <p style="text-align: justify;">Clicca qui per andare al link della pubblicazione.</p>